

Nome comune italiano	Vairone	Nome Scientifico	<i>Leuciscus souffia muticellus (Bonaparte, 1837)</i>
Nome comune straniero	Blageon (En), Blageon (Fr), Stromer (D)	Famiglia	<i>Cyprinidae</i>

Descrizione¹

Il Vairone è un ciprinide di taglia 15-20 cm, eccezionalmente 25 cm, dal corpo fusiforme, poco compresso lateralmente; il dorso è r nero-grigio con riflessi blu metallico, i lati argentei, il ventre bianco argenteo.

La pinne dorsale e le caudali sono grigie, pettorali, pinne ventrali e anale di colore giallo arancio, più acceso nel periodo riproduttivo; pinna dorsale con 10 raggi,

pinna
13 raggi
ventrale
I maschi

oltre alla
tonalità
hanno
tubercoli
capo.



anale con 10-
divisi, pinna
con 10 raggi.
nel periodo
riproduttivo,
livrea con
più accesa,
piccoli
nuziali sul

La bocca è in posizione ventrale, presenza di denti faringei disposti su due file. La linea laterale è giallo-rossastra.

I vaironi hanno un accrescimento lineare non molto veloce, alla fine del primo anno di vita misurano circa 6-7 cm, 10-12 cm alla fine del secondo e circa 13-14 cm verso la fine del terzo anno; solo pochi individui in genere raggiungono dimensioni maggiori.

La specie ha abitudini gregarie e forma spesso branchi di numerosi individui.

Rapporti con l'uomo

Il Vairone è un pesce comune in acque dolci non inquinate dove vi è poca luce, si individua anche per la tendenza al gregarismo, con formazione di piccoli gruppi.

La specie è protetta dalla Convenzione di Berna, allegato 3, e cacciabile dalla L. 11/02/1992, n. 157.

Osservazioni scientifiche²

Biologia

La specie predilige acque limpide, ricche di ossigeno e dotate di una discreta velocità di corrente; vive prevalentemente in prossimità del fondo, dove trova anche il nutrimento da plancton, vermi, piccoli animali bentonici e talvolta anche da resti vegetali.

La stagione riproduttiva va da maggio ad agosto; le uova vengono deposte in genere di notte su fondali preferibilmente ghiaiosi.

La maturità sessuale è raggiunta a circa 2 - 3 anni.

Areale

La specie è ampiamente diffusa in Europa centrale, presente in Francia, Germania, Italia, Slovenia, Svizzera ed Austria.

La sottospecie nei corsi d'acqua appenninici. Il costituito dalla Molise.

Il vairone è una una forte proprio areale di corso di questi principalmente a manomissione degrado di molti di



italiana è indigena alpini ed limite meridionale è Campania e dal

specie che ha subito contrazione del distribuzione nel ultimi decenni, causa della idraulica ed al quei corsi d'acqua

pedemontani che costituiscono il suo habitat preferenziale.

Nella Direttiva Habitat è indicata la specie *Leuciscus souffia* (Risso, 1826), in Italia tuttavia si dovrebbe fare riferimento, correttamente, alla sottospecie *muticellus*, qui descritta.

¹ Caratteristiche generali della specie

² Caratteristiche di interesse scientifico